

PLASTIC SURGERY GROUP


BY PROF. J. FARHADI

Brustrekonstruktion mittels Gewebe vom Bauch (DIEP)

Die Rekonstruktion der Brust mittels Gewebe vom Bauch ist die am häufigsten angewandte Methode innerhalb der Eigengewebsrekonstruktionen. Das Gewebe vom Bauch eignet sich sehr gut für eine Brustrekonstruktion und kann auch für eine beidseitige Rekonstruktion verwendet werden.

Es wird Haut und Unterhautfettgewebe vom Unterbauch entnommen und am Brustkorb an neue Blutgefässe angeschlossen. Dies geschieht unter mikroskopischer Vergrösserung (Mikrochirurgie).

Am Bauch ergibt sich der gleiche Effekt und die gleichen Narben wie nach einer Bauchdeckenstraffung.



FRAGEN:

- WIE FÜHLT SICH MEINE BRUST ANSCHLIESSEND AN?
- WANN KANN ICH WIEDER IN MEINEN NORMALEN ALLTAG ZURÜCKKEHREN?
- NIMMT DIE BRUST ZU WENN ICH ZUNEHME?
- IST DIE ONKOLOGISCHE NACHKONTROLLE DURCH DIE REKONSTRUKTION BEEINTRÄCHTIGT?

KURZINFO:

OP – Dauer: 3 Stunden

Narkose: Vollnarkose

OP - Setting: stationär

Arbeitsunfähigkeit: ca. 3-4 Wochen

Sportunfähigkeit: ca. 6-8 Wochen