
PLASTIC SURGERY GROUP

BY PROF. J. FARHADI

Korrektur Augenbrauen

Ein Absinken der Augenbrauen lässt den Blick müder und schwer wirken. Es empfiehlt sich daher die Brauen über einen direkten Schnitt am Augenbrauenoberrand anzuheben. Bei sehr ausgeprägten Befunden, vor allem bei älteren Männern, kann die horizontale Schnittführung im Bereich der Stirnmitte notwendig werden. In einer zweiten Sitzung nach ca. 4-6 Wochen folgt dann die Straffung des verbliebenen Hautüberschusses an den Oberlidern.

Das Anheben der Augenbrauen erfolgt in lokaler Betäubung. Bei guter Narbenheilung und konsequenter Narbenpflege sind die Narben im Verlauf wenig ersichtlich, da sie im Bereich der natürlich vorkommenden Hautfalten verlaufen.

FRAGEN:

- WAS IST EIN ENDOSKOPISCHES BRAUENLIFT?
- EINE NARBE ÜBER DEN AUGENBRAUEN? IST DAS NICHT SEHR AUFFÄLLIG?
- KANN MAN DEN EINGRIFF AUCH MIT EINER SCHLUPFLIEDKORREKTUR KOMBINIEREN?
- WIE LANGE BIN ICH NACH DER BEHANDLUNG NICHT GESELLSCHAFTSFÄHIG?

KURZINFO:

Eingriff in Lokalanästhesie

OP-Dauer: 45 Minuten

Ambulanter Aufenthalt

Arbeitsunfähigkeit: keine

Sport ab 2 Wochen postoperativ möglich