
PLASTIC SURGERY GROUP

BY PROF. J. FARHADI

Lippenmodellierung

Mit Hyaluronsäurepräparaten, sog. Fillern, kann das Volumen und die Form der Lippen modelliert werden. Auch können angeborene Asymmetrien korrigiert werden. Da die Filler bereits ein lokales Betäubungsmittel beinhalten, ist keine weitere örtliche Betäubung notwendig. Die Hyaluronsäure wird mit einer feinen Nadel in den Lippenrand, das Lippenrot und bei Bedarf auch in das Lippenweiss eingebracht. Es tritt umgehend ein Effekt auf und das gewünschte Endresultat kann gemeinsam mit dem Patienten gesteuert werden.

Durch die Lippenmodellierung kann ausserdem ein Aufspannen und somit Mildern von feinen Falten um den Mund erreicht werden.

Der Abbau der Hyaluronsäure ist individuell verschieden. Bei den meisten Patienten kommt es nach ca. 6-8 Monaten zu einem langsamen Verlust des gewonnenen Volumens.

FRAGEN:

- WIE VIEL VOLUMEN KANN AUF EINMAL EINGEBRACHT WERDEN?
- WIE GEHT MAN VOR, WENN DAS ERGEBNIS NICHT ZUFRIEDENSTELLEND IST?
- BEKOMMT MAN BLAUE FLECKEN DURCH DAS EINBRINGEN?

KURZINFO:

Behandlungs- Dauer:	30min
Anästhesie:	keine
Setting:	ambulant
Gesellschaftsfähig:	sofort
Effekt-Dauer:	6-12 Mon.
AUF:	keine