

---

# PLASTIC SURGERY GROUP

BY PROF. J. FARHADI

## Obere Blepharoplastik

Überschüssige Haut im Bereich der Oberlider lässt den Blick müde und traurig wirken. Auch kann es bei starker Ausprägung zu einer tatsächlichen Ermüdung des Auges und zur Gesichtsfeldeinschränkungen kommen. Eine Straffung der Oberlider ist eine häufig durchgeführte Operation welche in lokaler Betäubung durchgeführt werden kann. Es erfolgt eine Resektion der überschüssigen Haut und, falls erforderlich, von Fettgewebe. Die Narbe kommt in der natürlichen Lidfalte zu Liegen und ist nach abgeschlossener Heilung kaum sichtbar.

Eine obere Lidstraffung kann auch in Kombination mit einer unteren Lidstraffung durchgeführt werden.

### FRAGEN:

- KANN ES SEIN, DASS ICH DIE OPERATION NACH EINIGEN JAHREN WIEDERHOLEN MUSS?
- WIE LANGE BIN ICH NACH DER BEHANDLUNG NICHT GESELLSCHAFTSFÄHIG?

### KURZINFO:

Eingriff in Lokalanästhesie

OP-Dauer: 30 Minuten

Ambulanter Aufenthalt

Arbeitsunfähigkeit: keine

Sport nach 5 Tagen möglich

Als Kombinationseingriff mit unterer Lidstraffung möglich