

---

# PLASTIC SURGERY GROUP

BY PROF. J. FARHADI

## Oberschenkelstraffung

Bei störendem Hautüberschuss im Bereich der Oberschenkel empfiehlt sich die operative Straffung. Bei viel überschüssiger Haut, zB nach grossem Gewichtsverlust, erfolgt der Schnitt an der Innenseite des Oberschenkels vertikal (diese reicht bis zur Innenseite des Knies). Bei geringer ausgeprägtem Befund ist eine horizontale Schnitfführung ausreichend.

Meist wird die Oberschenkelstraffung mit einer Fettabsaugung kombiniert da so ein optimales Shaping erreicht werden kann. Im Anschluss empfehlen wir über 6 Wochen Kompressionshosen zu tragen, um eine optimale Kontur zu erreichen.

### FRAGEN:

- IST DER EINGRIFF MIT ANDEREN OPERATIONEN KOMBINIERBAR?
- WIE GEHT MAN VOR, WENN DAS ERGEBNIS NICHT ZUFRIEDENSTELLEN IST?
- WIE AUFFÄLLIG IST DIE NARBE TATSÄCHLICH?
- WERDEN DIE LYMPHGEFÄSSE BEI DER OPERATION GESCHONT?

### KURZINFO:

Eingriff in Allgemeinanästhesie

OP-Dauer: 120 Minuten

Ambulanter oder stationärer Aufenthalt

Arbeitsunfähigkeit: ca. 5 Tage

Sport nach 4 Wochen möglich