

---

# PLASTIC SURGERY GROUP

BY PROF. J. FARHADI

## Schamlippenkorrektur

Die operative Verkleinerung der inneren Schamlippen ist ein unkomplizierter Eingriff mit viel Effekt. Der Eingriff dauert 45-60 Minuten und wird in lokaler Betäubung oder im Dämmer Schlaf durchgeführt.

Das überschüssige Gewebe wird angezeichnet und danach die lokale Betäubung injiziert. Nun erfolgt die Resektion der überschüssigen Areale, sodass das natürliche Aussehen der Labien erhalten bleibt.

Die Klitoris selbst, wird bei dieser Operation nicht angetastet, es wird ausschliesslich das umliegende Gewebe reseziert und die Empfindsamkeit der Klitorios bleibt erhalten.

Der Wundverschluss erfolgt mit resorbierbarem Material, weshalb eine Fadenentfernung nicht erforderlich ist.

### FRAGEN:

- WIE LANGE DARF ICH NACH DER OPERATION KEINEN GESCHLECHTS-VERKEHR HABEN?
- WIE GEHT MAN VOR, WENN DAS ERGEBNIS NICHT ZUFRIEDENSTELLEN IST?

### KURZINFO:

Operation in Lokalanästhesie

Operationsdauer: 30 Minuten

OP-Setting: ambulant

Arbeitsunfähigkeit: 4 Tage

Sportkarenz: 3 Wochen