
PLASTIC SURGERY GROUP

BY PROF. J. FARHADI

Straffung Schamhügel

Kommt es im Alter oder nach einer Gewichtsabnahme zu einer Erschlaffung des Schamhügels kann eine operative Straffung die Lösung sein.

Über einen tief liegenden, horizontal verlaufenden Schnitt, erfolgt eine Freipräparation des Unterhautfettgewebes. Anschliessend kann das erschlaffte Gewebe in seine ursprüngliche Position zurück mobilisiert werden. Um eine stabile Fixierung des gestrafften Gewebes zu gewährleisten, erfolgt ein Wundverschluss in tiefen und oberflächlichen Schichten. Die Schamhügelstraffung kann alleine oder in Kombination mit einer Bauchdeckenstraffung durchgeführt werden.

FRAGEN:

- SIND DIE OPERATIONSNARBEN IM BIKINI SICHTBAR?
- WIE GEHT MAN VOR, WENN DAS ERGEBNIS NICHT ZUFRIEDENSTELLEN IST?
- WIE LANGE BIN ICH NACH DER BEHANDLUNG NICHT GESELLSCHAFTSFÄHIG?

KURZINFO:

Eingriff in Lokalanästhesie oder Allgemeinanästhesie

OP-Dauer: 45 Minuten

Ambulanter oder stationärer Aufenthalt (falls Kombinationseingriff)

Arbeitsunfähigkeit: 2 Tage

Sport nach 4 Wochen möglich